

Lunedì, 29 Marzo 2021, 18.29

A A

Farmacista33

CERCA

BIBLIOTECA DIGITALE
BACHECA ANNUNCI
FORMAZIONE
BANCA DATI ALIMENTI
BANDI E CONCORSI
CERCA LA FARMACIA
FORUM
NOVITÀ IN PRONTUARIO
DALLE AZIENDE

SERVIZI

HOME SANITÀ FARMACI DIRITTO OMEOPATIA FITOTERAPIA NUTRIZIONE GALENICA RICERCA IN CODIFA PROGETTARE LA FARMACIA

FARMACI

Home / Farmaci

LOGOUT

mar
24
2021

Vaccino AstraZeneca, Aifa: operatori sanitari vigilino su segni e sintomi. Ecco quali

TAGS: VACCINI, AIFA, VACCINO ANTI-COVID-19



Se nei giorni successivi alla vaccinazione anti-Covid compaiono segnali come mancanza di respiro, dolore toracico e mal di testa grave è necessario rivolgersi al medico. La nota Aifa

Se nei giorni successivi alla vaccinazione anti-Covid compaiono segnali come mancanza di respiro, dolore toracico, gonfiore alle gambe, dolore addominale

persistente, mal di testa grave o persistente e visione offuscata è necessario rivolgersi immediatamente ad un medico. Questo è quanto deve sapere i pazienti sottoposti alla vaccinazione e i segnali di tromboembolia e/o trombocitopenia su cui gli operatori sanitari devono vigilare. **A comunicarlo agli operatori Nota informativa importante concordata con le autorità regolatorie europee e l'Agenda italiana del farmaco (Aifa) sul vaccino Covid-19 AstraZeneca e rischio di trombocitopenia e disturbi della coagulazione.**

Punti chiave sul vaccino e l'informazione al paziente

A seguito della procedura di segnale condotta a livello europeo, l'Agenda Italiana del Farmaco fornisce gli operatori sanitari informazioni sui seguenti punti emersi dalla valutazione:

- Vaccino Covid-19 AstraZeneca: i benefici superano i rischi nonostante un possibile collegamento con casi molto rari di trombi associati ad un livello basso di piastrine.
- Una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnata da sanguinamento, è stata osservata molto raramente dopo la vaccinazione con il vaccino Covid-19 di AstraZeneca.
- Gli operatori sanitari devono vigilare su segni e sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia.
- I vaccinati devono essere informati della necessità di consultare immediatamente un medico se sviluppano sintomi quali: mancanza di respiro, dolore toracico, gonfiore alle gambe, dolore addominale persistente dopo la vaccinazione. Inoltre, chiunque abbia sintomi neurologici, inclusi mal di testa grave o persistente e visione offuscata dopo la vaccinazione, o noti lividi cutanei (petecchie) al di fuori del sito di vaccinazione dopo pochi giorni, deve rivolgersi immediatamente ad un medico.

I casi registrati e la revisione dell'Ema. Aggiornamento del Rcp



i nostri Blog



Cosmesi
a cura di Elena Penazzi



NaturaMedica
a cura di Fabio Firenzuoli



Nutrire la Salute
a cura di Rachele Aspesi



IN LIBRERIA



Le erbe anti-cancro
Fabio Firenzuoli, Francesco Epifani, Luigi Gori
Scheda Libro »

CONSULTA IL CATALOGO EDIZIONI EDRA >

ANNUNCI

INSERISCI IL TUO ANNUNCIO >



23/03/2021 21.31.08
Farmacista collaboratore
Vedi tutto l'annuncio >>

La nota ricorda che sono stati riportati casi di eventi tromboembolici a seguito della somministrazione del vaccino Covid-19 AstraZeneca in diversi paesi dell'Area economica europea, alcuni dei quali hanno portato a sospensioni locali di lotti specifici o dell'uso del vaccino stesso. Una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnata da sanguinamento, è stata osservata molto raramente dopo la vaccinazione con il vaccino Covid-19 AstraZeneca. Questo include casi gravi che si presentano come trombosi venosa, anche in siti di insorgenza insoliti come: trombosi cerebrale dei seni venosi, trombosi venosa mesenterica, nonché trombosi arteriosa in concomitanza con trombocitopenia. La maggior parte di questi casi si è verificata in donne di età inferiore ai 55 anni tra i sette e i quattordici giorni successivi alla vaccinazione, tuttavia ciò può riflettere l'aumento dell'uso del vaccino in questa popolazione. Alcuni casi hanno avuto un esito fatale.

Il Prac ha effettuato un'indagine completa con una tempistica accelerata, compresa un'attenta revisione delle segnalazioni dei casi presenti in EudraVigilance di trombi e trombocitopenia in soggetti che hanno ricevuto il vaccino, prestando particolare attenzione alle informazioni su: sesso, età, fattori di rischio, diagnosi di Covid-19 (se disponibile), tempo di insorgenza dei sintomi rispetto alla vaccinazione, esito e la gravità clinica. L'indagine ha incluso anche una revisione della letteratura collegata, un'analisi tra i dati osservati e i dati attesi condotta sulle segnalazioni di EudraVigilance, includendo i seguenti Termini preferiti del dizionario MedDRA: trombosi del seno venoso (cerebrale), coagulazione intravascolare disseminata e porpora trombocitopenica trombotica. Mentre si continua a raccogliere ulteriori evidenze, il Prac ha raccomandato un aggiornamento delle informazioni sul prodotto del vaccino Covid-19 AstraZeneca sospensione iniettabile, sulla base di quanto noto al momento su questo problema di sicurezza.

Iscriviti a Farmacista33

avrà in anteprima le notizie del giorno



Nicoloso B. R. - Le responsabilità del farmacista nel sistema farmacia
vai al download >>

© RIPRODUZIONE RISERVATA



16



Mi piace 23

Clicca sulla stellina per esprimere il tuo gradimento

(3 VOTI / MEDIA 3,333333) ★★★★★

Interessante

ULTIMI ARTICOLI DELLA SEZIONE

26-03-2021 | Sicurezza vaccino AstraZeneca, Ema prosegue aggiornamento e convoca gruppo di esperti

24-03-2021 | Farmaceutica. Fidia: siglato accordo con Sanofi per acquisizione di sette antinfiammatori

23-03-2021 | Vaccini anti-Covid. Ginecologi: nessuna controindicazione con pillola contraccettiva e Tos

SUL BANCO



Spray Decongestionante con acido ialuronico - Icomar

Scheda prodotto >>

I PIÙ LETTI DI FARMACI

10-02-2021 | Vaccino AstraZeneca, conservazione e indicazioni d'uso: aggiornamenti dal Ministero

22-03-2021 | Covid-19, Iss: carenza di vitamina D può contribuire a prognosi peggiore

23-03-2021 | L'antiparassitario ivermectina non raccomandato per Covid-19. La nota dell'Ema

23-03-2021 | Vaccini anti-Covid. Ginecologi: nessuna controindicazione con pillola contraccettiva e Tos

24-03-2021 | Farmaceutica. Fidia: siglato accordo con Sanofi per acquisizione di sette antinfiammatori

I PIÙ LETTI DI FARMACISTA33

20-03-2021 | Vaccino, revocato divieto utilizzo. Indicazioni su sicurezza tra pillola anticoncezionale e anticoagulanti

23-03-2021 | Farmacista vaccinatore: sicurezza, tutele e profili di responsabilità. Le criticità segnalate dai dipendenti

17-03-2021 | Covid-19. Gestione al domicilio: il punto sui farmaci raccomandati. Il ruolo della farmacia

18-03-2021 | Mascherine, non tutte sono idonee. Come riconoscere quelle di qualità

20-03-2021 | Di Sostegni. Dai farmacisti vaccinatori alla remunerazione farmacie, le novità per la categoria

ULTIMI MESSAGGI DI FARMACI

Vitamina d, aifa: con nota 96 calo consumi e più appropriatezza

Vaccino anti-covid-19 moderna, commissione europea approva il sesto accordo

Terapie covid, aifa: aggiornamenti su remdesivir, eparine e idrossiclorochina

Osteoartrosi, dolore e rigidità riducono la qualità della vita. il consiglio del farmacista

Dispensazione pillola 5 giorni dopo, cade obbligo di ricetta per le minorenni

RUBRICHE

SANITÀ
FARMACI
DIRITTO
OMEOPATIA
FITOTERAPIA
NUTRIZIONE
GALENICA
FISCO E TRIBUTI

SERVIZI

BACHECA ANNUNCI
BANCA DATI ALIMENTI
BANDI E CONCORSI
CERCA LA FARMACIA
FORMAZIONE
FORUM
NOVITÀ IN PRONTUARIO
DALLE AZIENDE

PAGINE DI SERVIZIO

BIBLIOTECA DIGITALE
CAMBIA INDIRIZZO
CHI SIAMO
CONTATTI
MISSION
NOTE LEGALI
PRIVACY
REGALA A UN COLLEGA

